

ștampila unității

## CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI!

### Îndrumări pentru părinți și tutori, în conformitate cu art. 34 alin. 5 S, 2 din Legea pentru prevenirea bolilor contagioase (Infektionsschutzgesetz, prescurtat IfSG)

Când copilul dvs. suferă de o boală contagioasă și frecventează școala sau un alt așezământ de folosire în comun, poate molipsi alți copii, cadre didactice și alt personal aferent. Tocmai sugarii și copiii au sistemul imunologic slăbit din cauza îmbolnăvirii, ceea ce poate duce la îmbolnăviri secundare (cu complicații).

Pentru a preveni aceasta, dorim să vă informăm prin acest pliant cu instrucțiuni despre obligațiile dvs., comportamentul adecvat și alte măsuri prevăzute de Legea pentru prevenirea bolilor contagioase. În această privință, trebuie să știți că, în general, bolile contagioase nu sunt de pus exclusiv pe seama curățeniei deficitare ori a simplei neatănții. De aceea, vă rugăm să dați dovadă mereu de deschidere și cooperare onestă în relația dvs. cu autoritățile de competență.

Potrivit legii, copilul nu are voie să meargă la școală ori la alte așezăminte frecventate de mai mulți dacă:

1. a contractat o boală infecțioasă gravă provocată de un număr mic de germeni patogeni. Potrivit legii, în această categorie de boli infecțioase se încadrează: difteria, holera, tifosul exantematic, tuberculoza și diareea provocată de bacteria *Escherichia coli* enterohemoragică (prescurtat, EHEC). Aceste boli sunt foarte rare în Germania (legea încadrează aici și febra virală hemoragică, ciuma și poliomielite. Însă probabilitatea ca acești germeni să fie transmiși pe teritoriul german este foarte mică);
2. este vorba de o boală contagioasă cu agravare și complicații, ca: tusea convulsivă, pojarul, parotidita epidemică, scarlatina, vărsatul de vânt (varicela), meningita declanșată de bacterii HiB (*Haemophilus influenzae*), infecțiile cu meningococi, râia, impetigo contagios (cauzat de streptococi sau stafilococi), hepatita virală A și dizenteria (shigellosis, șigheloza);
3. are păduchi de cap, iar terapia încă nu a fost încheiată;
4. înainte de împlinirea vârstei de 6 ani s-a îmbolnăvit de gastroenterită sau dacă există bănuiala că s-a îmbolnăvit de gastroenterită (inflamații la stomac și/sau intestin).

Căile de transmitere a bolilor enumerate mai sus sunt diferite. Multe dintre cazurile de diaree, precum și hepatita virală A reprezintă infecții prin contact indirect. Transmiterea are loc din cauza igienei precare (nеспălarea mâinilor) și contaminarea alimentelor cu necurătenii, mai rar prin contactul cu obiecte (prosop, articole de mobilier, jucării). Infecțiile prin aerosoli (sau prin stropi) sunt de exemplu pojarul, parotidita epidemică, vărsatul de vânt și tusea convulsivă. Prin contactul cu părul, tegumentele (pielea) și mucoasele sunt transmiși râia, păduchii și impetigo contagios.

Aceasta înseamnă că în așezămintele pentru publicul larg există condiții care favorizează transmiterea bolilor menționate. Așadar, vă rugăm să anunțați medicul de familie sau medicul pediatru de îndată ce copilul dvs. a contractat o asemenea boală infecțioasă epidemică (de exemplu când constatați febră mare, oboseală deosebită, vărsături, diaree mai mult de o zi și alte simptome îngrijorătoare).

Medicul vă va informa, în urma stabilirii diagnosticului, dacă este sau nu necesară măsura prevăzută de Legea pentru prevenirea bolilor contagioase, și anume interdicția pentru copilul dvs. de a frecventa locurile publice (grădinița, școala, baze sportive etc.).

În cazul tratării copilului acasă sau chiar în spital, vă rugăm să ne înștiințați urgent și să ne comunicați totodată diagnosticul stabilit de medic, ca să putem lua măsurile necesare împreună cu Inspectoratul de Sănătate Publică (Gesundheitsamt) în vederea stopării epidemiei.

Mai multe boli infecțioase au în comun contagiunea înainte să apară simptomele tipice bolii respective. Aceasta înseamnă că de la copilul dvs. s-au și molipsit alți copii, colegi de școală sau chiar personalul care se ocupă de copii. În acest caz, trebuie să informăm părinții celorlalți copii despre apariția respectivei boli contagioase. Dar informarea părinților o vom face prin păstrarea anonimatului dvs.

Câteodată, bacteriile ori virusurile pătrund în organismul copilului sau adultului, fără ca aceștia să se îmbolnăvească. Deci infecție fără declanșarea bolii. Pe de altă parte, agenții patogeni pot fi eliminați în unele cazuri și după ce pacientul a intrat în convalescență (deci practic vindecăt), și anume pe cale fecală ori prin picături din tuse și expirație. Așadar, germenii pot fi transmiși și pe această cale. Astfel, continuă să existe pericolul de contagiune atât pentru copiii din anturajul copilului dvs., cât și pentru personalul aferent. De aceea, Legea pentru prevenirea bolilor infecțioase prevede că persoanele pe cale de vindecare de holeră, difterie, *Escherichia coli*, tifos, paratifos și dizenterie (șigeloză) pot avea acces în clădirile publice numai după ce au fost autorizate și instruite de Inspectoratului de Sănătate Publică (Gesundheitsamt).

Chiar și în cazul în care la dvs. acasă cineva s-a îmbolnăvit de o boală contagioasă gravă, este posibil ca unii membri ai familiei să fi contractat germenii și apoi să-i elimine fără să se fi îmbolnăvit ei înșiși. Dar și în acest caz copilul dvs. trebuie să rămână acasă.

Când anume se impune interdicția de a frecventa locurile publice pentru copilul dvs., vă va comunica fie medicul care îl tratează, fie Inspectoratul de Sănătate Publică. Dar și în acest caz aveți obligația să ne înștiințați și pe noi.

Pentru prevenirea îmbolnăvirii de difterie, pojar, parotidită epidemică, poliomielită, tifos și hepatită virală A, vă stau la dispoziție vaccinuri. Dacă se constată protecție de pe urma vaccinării, Inspectoratul de Sănătate Publică poate să decidă în anumite cazuri ridicarea interdicției de deplasare. Vă rugăm să luați aminte: o protecție optimă asigurată prin vaccinare este atât în folosul fiecăruia în parte, cât și al întregii comunități.

Dacă aveți nevoie de lămuriri suplimentare, luați legătura cu medicul dvs. de familie ori cu pediatrul dvs. sau cu Inspectoratul de Sănătate Publică în raza căruia domiciliați. Vă putem îndruma și noi.